SEMENTI PER PRATO

PER LE TRASEMINE

Blend mono specie strisciante di Lolium perenne nelle varietà stolonifere "CONFIDENCE" e "STOLAWN", sementi conciate a secco con m.o. utili.
Adatto per trasemine di tappeti erbosi scuri sia in area ricreativa che sportiva.
Adatto anche per nuova semina.
Ideale per inerbire aree residenziali ad esposizione in pieno sole.
Il miscuglio è autorigenerante per il 100%, in poche settimane dalla semina è in grado di formare una cotica fitta e densa con colorazione verde scura.
Si consiglia di insediarlo a fine estate, in modo che il Loietto strisciante sia in grado, dopo l'inverno, di sviluppare gli stoloni superficiali.

Scatola da 1 Kg
Sacco da 7 Kg

Composizione:

% in peso	Specie & Cultivar
70% 30%	**Loietto perenne stolonifero Confidence** **Loietto perenne stolonifero Stolawn**
Composizione Concia:	Contenuto in micorrize (*Glomus spp*): 0,5% Contenuto in batteri della rizosfera: (*Pseudomonas spp.*) 3 x 10^9 UFC/g Contenuto in trichoderma: (*Trichoderma spp.*) 2 x 10^5 UFC/g

Consigli Tecnici

Terreni	Profondo, drenante di medio impasto.
Periodo di semina	Agosto-settembre-ottobre e marzo-aprile-maggio
Dosaggio Consigliato	Da 20-30 gr/mq. Si consiglia di non esagerare con il dosaggio, perché altrimenti si riduce la tendenza di emettere Stoloni superficiali da parte del "CONFIDENCE" e del "STOLAWN", causa dell'aumento della competizione tra le stesse piante o , nel caso di trasemina, con le essenze presenti. La germinazione può impiegare dai 4 ai 10 gg dipende dalla temperature del terreno (Temperatura del suolo richiesta superiore ai 10°C)
Taglio	Eseguite il primo taglio quando l'erba raggiunge i 6 cm e durante la gestione annuale all'ombra non scendere sotto i 6 cm, in aree miste Sole/Ombra tenere a 4 cm. Non asportare mai oltre il 30% della vegetazione presente
Nutrizione	Concimazione Fosfatica alla semina e poi all'ombra optare per un rapporto N/K 1:2 con non oltre 15 unità azotate mq/annue. In situazione di Sole/ombra non eccedere le 20 Unità di Azoto mq/annue
Irrigazione	Alla semina tenere il letto di semina costantemente umido per non fermare il processo di germinazione. Nel periodo estivo irrigare con 6 mm/giorno e incrementare a 10 mm/giorno in piena ombra da caducifoglie.
Fitostimolazione	Programmare 4 trattamenti biostimolanti tra luglio e agosto per aumentare la tolleranza all'ombra e agli stress ambientali estivi
Rigenerazione	Usare lo stesso miscuglio per la consueta rigenerazione di fine estate o di fine inverno, eseguite un leggero verticut con asporto del feltro.